

表5 対象者の口腔所見と加濃式社会的ニコチン依存度 (n = 95)

項目	n	(%)	平均	標準偏差	最小値	最大値
現在歯数	58 †		27.3	1.6	21	28
歯の健康づくり得点	94 †		13.5	3.6	3	20
10点以下	16	16.8				
11～15点	50	53.7				
16点以上	28	29.5				
歯肉出血症状のあるもの	53	55.8				
歯肉腫脹症状のあるもの	19	20.0				
歯肉出血と歯肉腫脹の両症状のあるもの	17	17.9				
喫煙や歯周病の有害性に関する認知度	93 †		5.6	2.0	1	10
講義前の加濃式社会的ニコチン依存度 (KTSND) 得点	95		9.5	4.6	1	25
KTSND得点 10以上	47	49.5				
非喫煙者のKTSND得点*	79		8.8	4.2	1	17
前喫煙者と喫煙者のKTSND得点	16		13.2	4.5	9	25
前喫煙者のKTSND得点	15		13.5	4.5		
喫煙者のKTSND得点	1		9			
講義後のKTSND得点**	90 †		4.6	4.2	0	21
KTSND得点 10以上	10	11.1				
非喫煙者のKTSND得点	74		4.2	3.8		
前喫煙者と喫煙者のKTSND得点	16		6.4	5.2		
前喫煙者のKTSND得点	15		6.5	5.4		
喫煙者のKTSND得点	1		5			
家族・同居者の喫煙 (受動喫煙) の有無による比較	92					
受動喫煙なし群のKTSND得点	53	42.4	9.2	4.0		
受動喫煙なし群講義後のKTSND得点			4.2	3.5		
受動喫煙あり群のKTSND得点	39	55.8	10.1	5.3		
受動喫煙あり群講義後のKTSND得点			5.2	4.9		

\*非喫煙者群のKTSND得点は、前喫煙者・喫煙者群のKTSND得点に比べ有意に低かった ( $P < 0.01$ )。

\*\*講義前のKTSND得点に比べ、講義後のKTSND得点は有意に低下した ( $P < 0.01$ )。

† 未記入者を除いた分析対象者